

Koncentrát humínových látok
/dynamický rastový stimulátor

Max LIGNO humát

- * priaznivý a komplexný vplyv na rastliny, zvýšenie aktivity fotosyntézy a tvorby chlorofylu
- * sprístupnenie živín obsiahnutých v pôde
- * zvýšenie využiteľnosti organických a priemyselných hnojív
- * zlepšenie príjmu doplnkovej výživy listom
- * podpora rozvoja koreňového systému
- * zlepšenie odolnosti rastlín voči stresovým faktorom
- * zvýšenie výnosov a zlepšenie kvality zberu
- * posilnenie a vyrovňovanie slabších porastov
- * celkové zlepšenie zdravotného stavu rastlín
- * urýchlenie regenerácie poškodených porastov



Lignohumát MAX je vysokokonzentrováný vodný roztok prípravku, získaného hydrolyticko-oxidačným rozkladom lignosulfonátov (prírodná surovina lignosulfonát vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe papiera z drevenej hmoty). Lignohumát MAX obsahuje zmes humínových a fulvových kyselín a ich solí, kde fulvové kyseliny a ich soli prevažujú.

Lignohumát MAX sa aplikuje predovšetkým foliárne.

Pri poľných plodinách je doporučená dávka 0,4 litra na 1 ha 2x za vegetačné obdobie. Pri chmeli, vinnej réve, ovocných stromoch, zelenine a jahodách je doporučená dávka 0,4 litra na 1 ha 4x za vegetačné obdobie.

Ďalej sa odporúča aplikácia pod päťu (pri poľných plodinách 0,3 l/ha), namáčanie sadby (u zemiakov apod.), morenie semien, resp. namáčanie a zálievka sadeníc (pri vinnej réve, ovocných stromoch apod.)

Lignohumát MAX odporúčame aplikovať spoločne s listovými hnojivami, či pesticídmi (s výnimkou herbicidov, kde sa odporúča samostatná aplikácia Lignohumátu MAX tri dni po aplikácii herbicidov).

Lignohumát je zaregistrovaný ako pomocný rastlinný prípravok a má charakter prírodného rastového stimulantu.




Lignohumát MAX je dodávaný
v balení 1, 5 a 10 litrov



Koncentrát huminových látok / dynamický rastový stimulant

Zloženie - obsah látok v sušine



Dávkovanie a miešateľnosť

- samostatné foliárne aplikácie - 0,4 l/ha 1–2× za vegetačné obdobie
- s kvapalnými hnojivami - 0,4 l/ha 1–2× za vegetačné obdobie
- s fungicídmi, insekticídmi a morforegulantmi - 0,4 l/ha 1–2× za vegetačné obdobie

Plodina	Aplikácia	Dávkovanie
Obilniny oziminy, jarniny, pšenica, jačmeň, žito, ovos, slazy	Pri aplikácii pod pálu	0,3 litra prípravku / 100 litrov štandardného roztoku
	Počas fázy odnožovania	0,4 litra prípravku / ha
	Počas fázy sľipkovania alebo natievania zrna	0,4 litra prípravku / ha
Reпка ozimá, reпка jarná	Od fázy 3 pravých listov, od teploty +5 °C	0,4 litra prípravku / ha
	Jarná regenerácia do obzrstenia listových ručíc	
	Pred začiatkom kvitnutia	
Kukurica	Od fázy 4–6 listov	0,4 litra prípravku / ha
	Od začiatku predĺžovacieho rastu do výšky 40 cm	
Slnečnica	Fáza 3–4 pravých listov	0,4 litra prípravku / ha
	V období kvetu	
Mak	Vo fáze listovej ručice	0,4 litra prípravku / ha
	Vo fáze predĺžovacieho rastu	
Zemiaky	Aplikácia v sadzách pri výsadbe	0,8 litra prípravku / 100 litrov štandardného roztoku
	Na začiatku predĺžovacieho rastu	0,4 litra prípravku / ha
	Na konci predĺžovacieho rastu	
	Od začiatku tvorby pukov až do konca	
Cukrová repa	Fáza 5–7 párov pravých listov	0,4 litra prípravku / ha
	Pri zapojení porastu	
	Začiatok ukladania sacharózy v buľve	
Hrach	V období 1–3. pravého listu	0,4 litra prípravku / ha
Soja	Fáza 1–3. trojlístka 2–3 týždne po prvej aplikácii	0,4 litra prípravku / ha
Krmoviny, trávne porasty	Regenerácia po zime, schádzajúce vysiate porasty	0,4 litra prípravku / ha
	Obzrstenie po prvej kosbe	
Vlna réva	Pri vývine 5–6 listov (jasne viditeľné kvetenstvo)	0,4 litra prípravku / ha
	Začiatok plného kvitnutia	
	Na začiatku tvorby bobulí	
Chmel	Na začiatku uzatvárania strapcov	0,4 litra prípravku / ha
	Pri dosiahnutí polovice až 3. výšky chmelnicovej konštrukcie	
	2 týždne po prvej aplikácii	
	Na začiatku tvorby osýpkov	
Ovocné kultúry	Na začiatku tvorby hlávok	0,4 litra prípravku / ha
	Pri plnom olistení	
	Pred kvetom	
	Začiatok tvorby plodov	

HumAgro, s.r.o., Partizánska 97, Banská Bystrica

e-shop

www.humagro.sk

tel.: +421 903 991 994 • e-mail: info@humagro.sk

